

適期収穫で秀品出荷をめざす！

過熟は、果実の劣化を早めます。品種に合わせた適期収穫を心がけましょう。



高冷地・8月下旬収穫
収穫後4日目に皮をむいた状態
左：「ゴールドラッシュ」
右：「ゴールドラッシュ86」

ゴールドラッシュ ゴールドラッシュネオ



従来品種より受粉後の登熟が早いので、先端部がやや未熟な状態で収穫適期となる。

ゴールドラッシュ86



「ゴールドラッシュ」より登熟が遅く、早め収穫(若どり)では糖度がのってこないで、先端まで十分着色して、粒がふくらみきってから収穫する。

ゴールドラッシュ88 ゴールドラッシュ90



「ゴールドラッシュ86」よりは早く糖度がのりやすく、先端部が十分着色した状態で収穫適期となる。

※渥美・西山地区などの砂地は、登熟が通常よりも早くなる可能性があります。

大切なのは土作り！ バイテクバイオエース

バイテクバイオエース 15kg (微生物肥料 N:P:K=1.89:6.04:2.91)

有機肥料としての側面だけでなく、有効微生物であるバイオ21菌(特許取得済)が有機物の分解能力にすぐれるため、収穫後のスイートコーン残渣を早期に腐熟させることができます。バイオ21菌の土壌改良効果で連作障害に強い土壌を作ることができます。(施用目安：150～300kg/10a)



バイテクバイオエース散布

ロータリーですき込み後、約1ヶ月の間にさらに2、3度の攪拌で腐熟の促進およびバイオ21菌の増殖



完成



スイートコーンの高品質化と倒伏・しなび防止に

高機能液体ケイ酸剤

バリカタ！

植物組織を硬化させて根張りをしっかりサポート！

使用方法

1000倍に希釈し、7～10日間隔で灌水チューブもしくは葉面散布にて施用します。

※酸性肥料のため石灰、アルカリ系資材/薬品(石灰硫黄合剤、銅剤)との混用はできません。



機能性アミノ酸

サカタ液肥GB

しなび防止、高温、乾燥、低温などのストレスに耐性向上！

使用方法

1000倍に希釈し、15～30日間隔で灌水チューブもしくは葉面散布にて施用します。

※強アルカリのため、原則農薬との混用はできません。



お問い合わせはお近くの営業所、販売店までお願いいたします。



豊かさ実る、タネを。

トヨタネ株式会社

店舗：豊橋市向草間町北新切 12-1
豊橋営業所：豊橋市向草間町北新切 12-1
豊川営業所：豊川市大堀町 323-1
渥美営業所：田原市古田町エゲノ前 138-1
田原営業所：田原市野田町長田 56-1

TEL(0532)46-3709
TEL(0532)46-3500
TEL(0533)84-7331
TEL(0531)33-0231
TEL(0531)25-1011

安城営業所：安城市大山町一丁目 3-9 TEL(0566)74-0231
松阪営業所：三重県多気郡明和町金剛坂 812-33 TEL(0596)52-7722
浜松営業所：浜松市北区細江町中川不動平 7172-150 TEL(053)527-2330
浜岡営業所：御前崎市佐倉 2977-1 TEL(0537)86-7161
静岡営業所：静岡市駿河区高松一丁目 4-7 TEL(054)237-7782
岐阜営業所：岐阜県羽島市江吉良町 2338 TEL(058)372-2677

本社：豊橋市向草間町北新切 12-1 / 〒441-8517
TEL(0532)45-4137(代) FAX(0532)45-4494
HP <http://www.toyotane.co.jp> E-mail: info@toyotane.co.jp