

酵母から生まれた
作物成長促進材

天候不順対策資材
減農薬・増収効果

ネオエスプラス

neosplus

素材そのものに由来する刺激作用が植物生理を活性化し、
成長ステージにプラス効果を促します。

■ご使用方法

葉面散布・灌注灌水ともに **1000 倍希釈**
灌水処理（流し込み） 原液 200mL/10a

■ポイント

育苗期、活着後の初期生育から収穫期までの
根の動く成長ステージに
ピンポイントで処理してください。

<1kg>

西日本興産株式会社

野菜の種類	処理ポイント
コマツナ、ホウレンソウ	育苗期（定植前） 移植活着後【初期生育促進】＜散布＞
トマト、ナス、キュウリ、 ピーマン、イチゴ	育苗期（定植前） 第1果房着果後から2～4週間に1回＜散布or灌水＞ なり疲れ時期（追肥時期、イチゴは収穫直後）＜灌水＞
スイカ、メロン、カボチャ	育苗期（定植前） ソフトボール大（追肥時期）【肥大促進】＜灌水＞
エダマメ	子葉・初生葉期、本葉3葉展開期（土寄せ時期）＜散布＞
ダイズ	エダマメ処理に開花期処理を追加
キャベツ、ハクサイ、 レタス	育苗期（定植前） 結球開始期（追肥時期、土寄せ期）までに2～3回＜散布＞
果樹（常緑・落葉）	生理落果後から4週間に1回（降雨利用）＜散布or灌水＞ 【落果防止、肥大促進、熟化、早期落葉防止】
アスパラガス	秋芽収穫後【根部シンク能を高める】 春芽収穫後【本葉シンク能を高める】＜散布or灌水＞
タマネギ、ラッキョウ、 ニンニク	育苗期（定植前） リン茎肥大開始期、リン片分化開始期＜散布＞
ダイコン、ニンジン	追肥時期、収穫前2030日【初期生育調整】＜散布＞
パレিশョ	塊茎形成期、開花期、収穫前30日＜散布＞
カンショ	梅雨明け時期、秋雨前線時期、収穫前30日＜散布＞
サトイモ	生育相転換期、根部肥大期＜散布＞
水稻	3葉期（田植え前日～当日）、6葉期（分けつ開始期）
麦	3葉期、6葉期（麦踏時期）＜散布＞
スイートコーン	3葉期、雄穂期、雌穂期（追肥時期）＜散布＞
ブロッコリー、カリフラワー	花蕾形成期（出蕾期）、花蕾肥大期＜散布＞ 【寒冷地域（夏秋）では根部・地上部の養分不足を軽減】