


ALA

のチカラで! 光合成アップのメカニズム ペンタキープ^{Hyper}5000



対象作物

ペンタキープシリーズは野菜、果樹、花類、食用作物、工芸作物等、下記の作物を含む多くの植物効果が確認されています。対象作物についてお問い合わせがございましたら、弊社ホームページなどをご参考いただけます。

葉茎菜類	アスパラガス、カリフラワー、キャベツ、コマツナ、シュンギク、セルリー、チンゲンサイ、ニラ、ネギ、ハクサイ、パセリ、ブロッコリー、ホウレンソウ、ミズナ、ミツバ、レタス等	作物・豆類	イネ(水稲)、インゲンマメ、エダマメ、エンドウマメ、ソラマメ、ダイズ、チャ、ムギ等
果菜類	イチゴ、オクラ、カボチャ、キュウリ、スイートコーン、スイカ、トマト、ナス、パプリカ、ピーマン、メロン等	果樹	イチジク、オウトウ、モモ、カキ、カンキツ類、キウイフルーツ、ニホンナシ、ヨウナシ、ビワ、ブドウ、ブルーベリー、マンゴー、リンゴ等
根菜類	カンショ、クワイ、コンニャク、イモ、サツマイモ、ジャガイモ、ダイコン、タマネギ、テンサイ、ナガイモ、ニンジン、ニンニク等	鉢花	シクラメン、シネリア、パンジー、プリムラ、ベンジャミン、ラン等
		切り花	アルストロメリア、カーネーション、カスミソウ、キク、スイトピー、スターチス、ストック、トルコギキョウ、バラ、ユリ、リンドウ等
		その他	シバ、タバコ等

希釈倍率と施用量

施用方法	標準希釈倍率	施用液の100リットルあたりの原液量	施用量の目安	施用間隔
茎葉散布	5,000~7,000倍	14~20ml	茎葉が濡れる程度	1~2週
根圏施用	10aあたり100ml~200mlを目安にしてください。		通常の灌水量	1~2週

※根圏施用の場合は、10aあたり100ml~200mlを目安にしてください。 ※希釈倍率と施用量は目安です。お試しの上ご使用ください。
※茎葉散布・単用施用時は展着剤のご使用をおすすめします。

▲使用上の注意

- 正確に計量してください。●施用液は使用の都度作成し、作り置きしないでください。●効果をより安定させるために単用施用をおすすめします。
- 石灰、硫黄剤、アルカリ性資材との混用は避けてください。●茎葉散布の場合は散布時の温度に気をつけてください。30℃を超える場合は夕方に施用してください。
- pH8以上の用水に混合した場合、効果が低下します。●希釈倍率と施用量は目安です。お試しの上ご使用ください。植物の特性上、作物、品種、生育段階、生育状態、気象条件、肥培管理等により感受性が異なります。

販売元・製造元

S&H 株式会社 誠和 <http://www.seiwa-ltd.jp>

〒329-0412 栃木県下野市柴262-10 TEL.0285(44)1751

仙台営業所	〒981-8003 宮城県仙台市泉区南光台7-4-1	TEL.022(349)5186
	メゾンセフィラ2F 906	
小金井営業所	〒329-0412 栃木県下野市柴262-10	TEL.0285(44)1020
豊橋営業所	〒440-0083 愛知県豊橋市下地町若宮55-2	TEL.0532(55)3911
大阪営業所	〒562-0003 大阪府箕面市西小路3-11-28	TEL.072(721)1821
高知営業所	〒783-0062 高知県南国市久礼田青木431-3	TEL.088(862)0311
久留米営業所	〒834-0121 福岡県八女郡広川町大字広川182-4	TEL.0943(32)5963

▲【販売店様へ：在庫保管上の注意】直射日光、および極端な低温や高温を避けて(望ましくは+5℃~30℃)暗所保管してください。

1406SE

ホームページをご覧ください。▶▶▶

取扱い店