

トヨタネでは今年もキャベツとブロッコリーの品種比較試験をします。

キャベツ・ブロッコリーともに4~5作型を設けています。
播種・定植・収穫などの管理を揃え、品種の特性を見極めていきます。

もちろん見学も可能ですので、ご自身の畑と比較していただくのも良いですし、
新有力品種の発見に来ていただくのも良いと思います！

🌸 作型一覧

	11月収穫	12~1月収穫	1~2月収穫	3~4月収穫	春キャベ/春ブロ	
キャベツ	播種日	7/27	8/10頃	8/17頃	8/29頃	
	品種数	「藍天」 「YRしぶき」 「かぐや」 など13品種	「冬藍」 「しぶき2号」 「ないと」 など約23品種	「そらと」 「YRたかみね」 ★「冬銀河」 など約17品種	「りくと」 「冬のぼり」 ★「龍溪」 など約15品種	「きよな」 「春系305」 「晩抽みつき」 など約16品種
	播種日	7/27	8/10頃	8/25頃	9/10頃	1/10頃
	品種数	「ボルト」「ベルネ」 「グリーンデルタ」 「CRルイス」 「TS-B671」 など約12品種	「たかみどり」 「バンベル」 など約16品種	「ブルガ」 「クリア」 など約22品種	「すずか」 「ゆめさくら」 「N-435」 など約9品種	「恵麟」 「ベルネ」 など約12品種

🌱 トヨタネ研究農場的 根こぶ対策

- 作終わりには、根こぶ発生株はすべて引き抜き圃場に残さない
- 「消石灰」で圃場のpH 高める & 「WHITE シリカ」で排水性 UP
元肥前に、「リセット堆肥」「地力の素」とともに圃場に散布・混和しておく
- 「フロンサイド SC」で徹底防除
10aあたり 500ml を 100-200L 散布し、元肥と一緒に土壤に混和

詳細は各担当者までお問い合わせください。

+α

畝立後の全面土壤散布で
株腐病の防除にも！

※ブロッコリーには使用できません

軟質ゼオライトは保肥力があり、
肥効を増大させる効果も！

