

キャベツ、ハクサイ、ブロッコリーへのおすすめ品種4選！

## ① ライ太郎 (ライ麦) 根こぶ病菌低減効果！

- ・根こぶ病のおとり作物として菌密度減少効果
- ・低温条件でも発芽が可能、初期生育も旺盛

播種量：8～10kg/10a      すき込み期：播種後60日程度

播種期：3～5月（根こぶ病対策には菌が活性化する時期に栽培する必要あり）

## ② いつでもスーダン (スーダングラス)

黒斑細菌病に強くて安心！

- ・圃場で黒斑細菌病の発生源とならない。
- ・出穂が遅く、すき込みスケジュールを調整しやすい。

播種量：4～5kg/10a

播種期：5～8月（平均気温15℃以上）すき込み期：播種後70日程度

## ③ ナモイ (ヘアリーベッチ)

マメ科の窒素固定で減肥！

- ・土壌にすき込むことで窒素肥沃度が向上
- ・根が深く伸長するので排水性の改善、耕盤破碎が期待できる

播種量：3～5kg/10a

播種期：2月下旬～4月中旬      すき込み期：播種後60日程度（草丈30～40cm程）

## ④ TSソルゴー (ソルガム) 多くの有機物を補給！

- ・極晩生で出穂時の草丈3m、有機物量が豊富な大型ソルゴー
- ・根張りが強く、耐倒伏、排水性改善が期待できる

播種量：4～6kg/10a

播種期：5～8月      すき込み期：播種後90～100日程度