

猛暑・干ばつを

バイオスティミュラント資材

スキープオン・アグリ
Skeepon Agri

過酷な環境ストレスに対抗する新提案。
独自の酢酸パワーで
高温・乾燥対策遺伝子を活性化！

乗り切る力



1L


増強。

酢酸の力が植物の持つ耐性遺伝子を呼び覚ます！

<葉菜類 実績>

ハクサイ

灌注時期：定植後（低温・乾燥時）



Skeepon Agri

対照区

定植直前に500倍希釈でドブ漬け。
乾燥などの環境ストレスに強くなったため、
根ばりが促進された。生育に関しても試験区の方がよい。

<果菜類 実績>

トマト

灌注時期：①定植直前に1回
②定植直前に1回、定植 1ヶ月後



対照区

Skeepon Agri ①

Skeepon Agri ②

Skeepon Agri

対照区

トマトのハウス栽培にて、定植1週間前に500倍希釈したSAを灌注。
水のみの方より、黄化症状なく、生育も良化した。
生育量の向上が見られた。

<葉菜類 育苗期 実績>

キャベツ

灌注時期：育苗（高温・乾燥時）



Skeepon Agri

対照区

セルトレーで育苗をし、ハウス内が40℃以上の高温状態。
対照区は枯れてしまう株が多数だったが、
試験区は多数がしっかりとした樹勢で残っていた

<根菜類 実績>

サツマイモ

灌注時期：定植後（高温・乾燥時）



Skeepon Agri

対照区

Skeepon Agri

対照区

定植直前に500倍希釈で10分から15分ドブ漬け。
定植後の生育に差が出ている。

（理研ベンチャー認定企業アクプランタ株監修）

使用方法

灌水の場合：10aあたり500～1000L（原液1～2L）

育苗期の場合：500倍希釈液を灌注処理 ※おすすめステージ

使用頻度：月2～3回

（天候状況によって変わります）

規格 500ml・1L・5L

使用上の注意

- ・希釈倍率を守ってご利用ください。
- ・本品は農薬ではありません。
- ・希釈したら使い切ってください。
- ・使用後は蓋をしっかりと閉めて保管してください。
- ・誤って目や口に入った場合はすぐに水で洗い流し、
医師の診察を受けてください。

製造元



理研ベンチャー認定企業
アクプランタ株式会社

販売元

大興貿易株式会社

〒163-0705 東京都新宿区西新宿2-7-1

TEL:03-3346-9761 FAX:03-3346-9755

<https://www.e-neem.com>

取扱店