

適用害虫と使用方法 使用上の注意事項(抜粋) ●天敵類に影響があるので使用に際しては注意してください。●水なす、賀茂なすの果実には薬害を生じるので、使用しないでください。

週用舌虫⊂使用力						
作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
さといも	ハダニ類	2000倍				
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ、ハスモンヨトウ、コナジラミ類、ハダニ類、	2000~3000倍		収穫7日前まで		
	アリモドキゾウムシ、イモゾウムシ				2回以内	
やまのいも	ハスモンヨトウ、ナガイモコガ、ハダニ類	2000倍		収穫前日まで		
かぶ	トラスジノミハムシ、コナガ					
だいこん はつかだいこん	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、カブラハバチ類、キスジノミハムシ				10	-
にんじん		2000~3000倍		収穫7日前まで		-
結球あぶらな科葉菜類※1、	コナガ、アオムシ、ウワバ類、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ、	2000 30000		状度/口的のこ	2回以内	
はなやさい類※2	オオタバコガ、アザミウマ類、シロイチモジョトウ		100~300l/10a			散布
非結球あぶらな科葉菜類	コナガ、アオムシ、アザミウマ類	3000倍			10	
レタス、非結球レタス	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ナモグリバエ、			収穫3日前まで		
レタス、非和ホレタス	アザミウマ類、シロイチモジヨトウ	2000~3000倍		収憶5口削より		
しゅんぎく	シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ	2000 0000		収穫7日前まで		
ほうれんそう	アザミウマ類、ハスモンヨトウ			AND DISSO		
しそ科葉菜類(えごま〈葉〉を除く)。 しそ(花穂)	アザミウマ類	2000倍		収穫3日前まで	2回以内	
4* ***********************************	ハモグリバエ類	2000~3000倍				
鱗茎類(根物、ただし、 にんにく、らっきょうを除く)**3	アザミウマ類	20倍	2.0l/10a	収穫7日前まで		無人航空機による散布
ねぎ	ネギコガ、ハモグリバエ類、シロイチモジヨトウ、アザミウマ類、	2000~3000倍			本剤:2回以内 フルキサメタミド剤:	
	クロバネキノコバエ類	と000~3000倍			4回以内 4回以内 4回以内 4回以内 4回以内 4回以内 4回以内 4回以内	散布
140		2000倍	10/m²	収穫21日前まで	本剤:1回株元灌注は1回以内	株元灌注
	ネダニ類		-	植付時	本剤:1回 散布は2回以内)	30分間苗浸漬
にら			10/m	収穫14日前まで	本剤:1回 フルキサメタミド剤: 2回以内 (株元療法は1回以内	株元灌注
ヤングコーン	アザミウマ類、クロバネキノコバエ類		100, 2000/100	収穫7日前まで	本剤:1回(株元灌注は1回以内)	1
未成熟とうもろこし	- ハダニ類	2000~3000倍	100~300l/10a		10	-
トマト、ミニトマト	ハスモンヨトウ、オオタバコガ、コナジラミ類、アザミウマ類、トマトサビダニ、 ハモグリバエ類、トマトキバガ					
ピーマン及びとうがらし類						
ヒーマノ及びとうからし類	オオタバコガ、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダ二類、チャノホコリダニコナジラミ類、アザミウマ類、ハダ二類、チャノホコリダニ、			収穫前日まで		
なす	ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハモグリバエ類	2000倍		松短別口のこ		散布
うり類(未成熟)※4	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、ウリノメイガ、ハダニ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類		100~300l/10a			
うり類(成熟、ただし、すいか、メロンを除く)※5	オオタバコガ、ウリノメイガ、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、					
	ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類				2回以内	
豆類(種実、ただし、だいず、あずき、らっかせいを除く)	ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、アザミウマ類 アズキノメイガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、アザミウマ類、ハダニ類	2000~3000倍				
あずき	アスキンスイル、バスモンコトン、バモンリバエ類、アリミツマ類、バター類 ハスモンヨトウ	16倍	0.8~1.6l/10a	収穫14日前まで		無人航空機による散布
だいず		1010	0.0 - 1.06/ 104			による散布
えだまめ	ウコンノメイガ、オオタバコガ、フタスジヒメハムシ、ハダニ類	2000~3000倍	100 0001/10-			
豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く)	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類		100~300l/10a			
いちご	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハダニ類			収穫前日まで		散布
アスパラガス	ハスモンヨトウ、アザミウマ類、ハダニ類、ジュウシホシクビナガハムシ	2000倍	100~500l/10a			
オクラ	ハスモンヨトウ、オオタバコガ		100~300l/10a			
しょうが	ハスモンヨトウ	2000~3000倍	10/	児業の口共士不	大朝の日以内	14 - 34632
ಶಿಂಕ್ಕರ	ネダニ類	2000倍	10/m [†]	収穫30日削まで	本剤:2回以内 フルキサメタミド剤: 本剤:1回 5回以内	株元灌注 30分間種球浸漬
	 ホモノハダニ	2000倍	_	加图7分割	(種球への処理は	50万间俚球皮漠
	ハモグハダニ		100~300l/10a	Da 収穫14日前まで	1回以内、 株元灌注は2回以内	散布
	アザミウマ類	2000~3000倍	2.0l/10a		本剤:2回以内 散布及び 無人航空機散布は 合計2回以内)	無人航空機による散布
にんにく	 ハモグリバエ類				フルキサメタミド剤:	による散布
		2000~3000倍 20倍	100~300l/10a	収穫7日前まで 本剤:1回	2回以内	散布
	アザミウマ類		2.0l/10a 100~300l/10a		コロ以内、 散布及び	無人航空機による散布
	チューリップサビダニ		- 100~300k/10a		無人航空機散布は 本剤:1回 合計1回以内)	散布 120分間鱗片浸漬
茶	チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、 マダラカサハラハムシ、ヨモギエダシャク、チャノホソガ、チャトゲコナジラミ	2000倍	200~400ℓ/10a 摘採1			120/J [0]39/ 1 <u>X</u> /P
	サビダニ類、チャノホコリダニ	2000~3000倍	1	יאניון. יאניון		
いちじく	アザミウマ類		200~700l/10a	収穫前日まで		#4-1-
食用ぎく				収穫3日前まで		散布
きく	ハスモンヨトウ、ハダニ類、オオタバコガ、アザミウマ類	2000倍	100~300l/10a	発生初期	2回以内	
きく(葉)			, 00 0006/10d	収穫 4日削まで		
りんどう	リンドウホソハマキ、ハダニ類、アザミウマ類			発生初期		
ゆり	マー・ロープサビビー	2000~3000倍	-	植付前	10	30分間種球浸漬
チューリップ	チューリップサビダニ	2000倍	100~300l/10a	何化俊~	2回以内	散布

*本剤及びフルキサメタミドを含む農薬の総使用回数の制限を示す。

※1 結球あぶらな科薬菜類キャベツ、はくさい、メキャベツ ※2 はなやさい類・プロッコリー、カリフラワー、茎ブロッコリー ※3 鱗茎類(根物):たまねぎ、葉たまねぎ、食用ゆり、葉にんにく、のびる、ベルギーエシャロットなど ※4 うり類(未成熟):きゅうり、きゅうり(花)、ズッキーニ、ズッキーニ、花)、にがうり、赤毛ウリ、食用ひょうたん、食用へちま、しろうり、とうがん、はやとうり、ゆうがお、エホパク ※5 うり類(成熟):かぼちゃ、まくわうり、漬物用よくわうり、漬物用すいか、ツノニガウリなど

最新の 製品情報は こちら



●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2025年10月末現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号 ホームページ https://www.nissan-agro.net/ お客様窓口 TEL.03-4463-8271(9:00~17:30 土日祝日除く)