

速く効く。
あの害虫にも効く。
だから、
収量に差がつく。



無処理 残葉率 0%



A剤 残葉率 20%



グレースシア乳剤 残葉率 90%

食害される前に駆除できる。^{*3}

野菜・
茶用
殺虫剤

グレースシア[®] 乳剤

農業用散布殺虫剤^{*4}
売上No.1



- 有効成分フルキサメタミド配合。
抵抗性コナガにも卓効
- 葉内に薬剤が浸透、葉裏の害虫も退治
- 幅広いチョウ目害虫に効果
- 殺虫効果は約2週間持続



^{*1} 作物によって適用害虫は異なります。詳しくは裏面をご覧ください。

^{*2} 効果は害虫の発生密度や天候、栽培環境等によって異なる場合があります。

^{*3} グレースシア乳剤のハスモンヨトウ終齢幼虫に対する速効性試験 2018年日産化学生物科学研究所（社内試験）【試験方法】虫体浸漬、処理1時間後餌入、20時間後撮影

^{*4} 農業要覧 2024より、農業用散布殺虫剤として

適用害虫と使用方法

使用上の注意事項（抜粋） ●天敵類に影響があるので使用に際しては注意してください。 ●水なす、賀茂なすの果実には薬害を生じるので、使用しないでください。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	総使用回数*		使用方法										
さといも	ハダニ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内		散布										
	ハスモンヨトウ	2000～3000倍															
かんしょ	ナカジロシタバ、ハスモンヨトウ、コナジラミ類、ハダニ類、アリモドキゾウムシ、イモゾウムシ			収穫前日まで	1回												
やまのいも	ハスモンヨトウ、ナガイモコガ、ハダニ類	2000倍															
かぶ	キスジノミハムシ、コナガ			2000～3000倍	収穫7日前まで	2回以内											
だいこん	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、カブラハバチ類、キスジノミハムシ	1回															
はつかだいこん	ハスモンヨトウ、ヨトウムシ			2000～3000倍	収穫3日前まで	2回以内											
結球あぶらな科葉菜類※1、はなやさい類※2	コナガ、アオムシ、ウツバ類、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ、オオタバコガ、アザミウマ類、シロイチモジヨトウ	3000倍						1回									
非結球あぶらな科葉菜類	コナガ、アオムシ、アザミウマ類			2000～3000倍	収穫7日前まで	2回以内											
レタス、非結球レタス	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ナモグリバエ、アザミウマ類、シロイチモジヨトウ	2000～3000倍						収穫3日前まで	2回以内								
しゅんぎく	シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ		2000倍	収穫7日前まで	2回以内												
ほうれんそう	アザミウマ類、ハスモンヨトウ	2000倍				収穫3日前まで	2回以内										
しそ科葉菜類(えごま(葉)を除く)、しそ(花穂)	アザミウマ類		2000～3000倍	20ℓ	2.0ℓ/10a			収穫7日前まで	無人航空機による散布								
鱗茎類(根物、ただし、にんにく、らっきょうを除く)※3	アザミウマ類	2000～3000倍				100～300ℓ/10a	本剤:2回以内			フルキサメタミド剤:4回以内 (苗浸漬は1回以内、株元灌注は1回以内、散布は2回以内)	散布						
ねぎ	ネギコガ、ハモグリバエ類、シロイチモジヨトウ、アザミウマ類、クロバネキノコバエ類		2000倍	1ℓ/㎡	収穫21日前まで			本剤:1回	株元灌注								
	ネダニ類	-				植付時	本剤:1回			30分間苗浸漬							
にら	アザミウマ類、クロバネキノコバエ類	2000倍	1ℓ/㎡	収穫14日前まで	本剤:1回	フルキサメタミド剤:2回以内 (株元灌注は1回以内、散布は1回以内)	株元灌注										
	ヤングコーン							収穫7日前まで	本剤:1回	1回							
未成熟とうもろこし	ハダニ類	2000～3000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布											
トマト、ミニトマト	ハスモンヨトウ、オオタバコガ、コナジラミ類、アザミウマ類、トマトサビダニ、ハモグリバエ類、トマトキバガ	2000倍	100～300ℓ/10a														
ピーマン及びとうがらし類	オオタバコガ、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、チャノホコリダニ																
なす	コナジラミ類、アザミウマ類、ハダニ類、チャノホコリダニ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハモグリバエ類																
うり類(未成熟)※4	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、ウリノメイガ、ハダニ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類																
うり類(成熟、ただし、すいか、メロンを除く)※5	アザミウマ類	2000～3000倍	0.8～1.6ℓ/10a														
すいか、メロン	オオタバコガ、ウリノメイガ、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類																
豆類(葉類、ただし、だいず、あずき、らっきょうを除く)	ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、アザミウマ類						2000～3000倍	100～300ℓ/10a									
あずき	アズキノメイガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、アザミウマ類、ハダニ類																
だいず	ハスモンヨトウ	2000～3000倍	100～300ℓ/10a														
えだまめ	アザミウマ類、マメシンクイガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ウコンノメイガ、オオタバコガ、フタスジヒメハムシ、ハダニ類																
豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く)	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類			2000倍	100～500ℓ/10a												
いちご	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハダニ類																
アスパラガス	ハスモンヨトウ、アザミウマ類、ハダニ類、ジュウシホシクビナガハムシ	2000～3000倍	100～300ℓ/10a														
オクラ	ハスモンヨトウ、オオタバコガ																
しょうが	ハスモンヨトウ			2000倍	1000倍	収穫30日前まで	本剤:2回以内	フルキサメタミド剤:5回以内 (種球への処理は1回以内、株元灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)	株元灌注								
らっきょう	ネダニ類									2000～3000倍	2.0ℓ/10a	植付前	本剤:1回	30分間種球浸漬			
	ホモノハダニ	2000～3000倍	2.0ℓ/10a												100～300ℓ/10a	本剤:2回以内	無人航空機による散布
	ハモグリバエ類																
	アザミウマ類			2000～3000倍	2.0ℓ/10a	100～300ℓ/10a	本剤:1回	120分間鱗片浸漬									
にんにく	ハモグリバエ類								2000～3000倍	2.0ℓ/10a	100～300ℓ/10a	本剤:1回	無人航空機による散布				
茶	アザミウマ類	2000倍	200～400ℓ/10a											摘採14日前まで	1回	散布	
	チューリップサビダニ																2000～3000倍
	アザミウマ類			2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	発生初期									
	いちじく								2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	発生初期				
食用ぎく	2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで											2回以内	発生初期		
きく																2000～3000倍	200～700ℓ/10a
きく(葉)				2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	発生初期									
りんどう									2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	発生初期				
ゆり	2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで											2回以内	発生初期		
チューリップ																2000～3000倍	200～700ℓ/10a
チューリップ				2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	発生初期									
チューリップ									2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	発生初期				
チューリップ	2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで											2回以内	発生初期		
チューリップ																2000～3000倍	200～700ℓ/10a
チューリップ				2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	発生初期									
チューリップ									2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	発生初期				
チューリップ	2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで											2回以内	発生初期		
チューリップ																2000～3000倍	200～700ℓ/10a
チューリップ				2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	発生初期									
チューリップ									2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	発生初期				
チューリップ	2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで											2回以内	発生初期		
チューリップ																2000～3000倍	200～700ℓ/10a
チューリップ				2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	発生初期									
チューリップ									2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	発生初期				
チューリップ	2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで											2回以内	発生初期		
チューリップ																2000～3000倍	200～700ℓ/10a
チューリップ				2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	発生初期									
チューリップ									2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	発生初期				
チューリップ	2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで											2回以内	発生初期		
チューリップ																2000～3000倍	200～700ℓ/10a
チューリップ				2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	発生初期									
チューリップ									2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	発生初期				
チューリップ	2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで											2回以内	発生初期		
チューリップ																2000～3000倍	200～700ℓ/10a
チューリップ				2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	発生初期									
チューリップ									2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	発生初期				
チューリップ	2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで											2回以内	発生初期		
チューリップ																2000～3000倍	200～700ℓ/10a
チューリップ				2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	発生初期									
チューリップ									2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	発生初期				
チューリップ	2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで											2回以内	発生初期		
チューリップ																2000～3000倍	200～700ℓ/10a
チューリップ																	

*本剤及びフルキサメタミドを含む農薬の総使用回数の制限を示す。

※1 結球あぶらな科葉菜類：キャベツ、はくさい、メキャベツ ※2 はなやさい類：ブロッコリー、カリフラワー、茎ブロッコリー ※3 鱗茎類（根物）：たまねぎ、葉たまねぎ、食用ゆり、葉にんにく、のびる、ベルギーエシャロットなど ※4 うり類（未成熟）：きゅうり、きゅうり（花）、ズッキーニ、ズッキーニ（花）、にがうり、赤もくろ、食用ひょうたん、食用へちま、しろうり、とうがん、はやとりの、ゆがお、エボク ※5 うり類（成熟）：かぼちゃ、まくわうり、漬物用まくわうり、漬物用メロン、漬物用すいか、ツノニガウリなど

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2025年10月末現在の登録内容に基づいています。

最新の
製品情報は
こちら



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号

ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>

お客様窓口 TEL.03-4463-8271 (9:00～17:30 土日祝日除く)