

「多品目栽培」 だったら、 グレーシア。

農業用散布殺虫剤

売上No.1^{*1}



多彩な作物に登録があり、
さまざまな種類の害虫に効く。
多品目を栽培している
生産者の方におすすめします。

野菜・
茶用
殺虫剤

速く効く。あの害虫^{*2}にも効く。
だから、収量に差^{*3}がつく。

グレーシア[®] 乳剤

- 有効成分フルキサメタミド配合。幅広いチョウ目害虫に卓効
- 殺虫効果は約2週間持続
- アザミウマ、コナジラミ、ハダニ類などの同時防除も可能^{*1}
- ミツバチ、マルハナバチは翌日導入可能

*1 農業要覧2024より、農業用散布殺虫剤として。 *2 作物によって適用害虫は異なります。詳しくは裏面をご覧ください。
*3 効果は害虫の発生密度や天候、栽培環境等によって異なる場合があります。 ®は日産化学(株)の登録商標



適用害虫と使用方法

使用上の注意事項(抜粋) ●天敵類に影響があるので使用に際しては注意してください。 ●水なす、賀茂なすの果実には葉害を生じるので、使用しないでください。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	総使用回数*		使用方法			
さといも	ハダニ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内		散布			
	ハスモンヨトウ	2000～3000倍								
かんしょ	ナカジロシタバ、ハスモンヨトウ、コナジラミ類、ハダニ類、アリモドキゾウムシ、イモゾウムシ			2000倍	収穫前日まで					
やまのいも	ハスモンヨトウ、ナガイモコガ、ハダニ類	2000～3000倍			収穫7日前まで	1回				
かぶ	キスジノミハムシ、コナガ									
だいこん	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、カブラハバチ類、キスジノミハムシ									
はつかだいこん	ハスモンヨトウ、ヨトウムシ	2000～3000倍		2回以内						
にんじん	コナガ、アオムシ、ウツバ類、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ハイマダラノメイガ、オオタバコガ、アザミウマ類、シロイチモジヨトウ									
結球あぶらな科葉菜類※ ¹ 、はなやさい類※ ²	コナガ、アオムシ、アザミウマ類	3000倍		1回						
レタス、非結球レタス	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ナモグリバエ、アザミウマ類、シロイチモジヨトウ	2000～3000倍		収穫3日前まで	2回以内					
しゅんぎく	シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ		収穫7日前まで							
ほうれんそう	アザミウマ類、ハスモンヨトウ	2000倍	収穫3日前まで							
しそ科葉菜類(えごま(葉)を除く)、しそ(花穂)	アザミウマ類	2000～3000倍	収穫7日前まで	無人航空機による散布						
鱗茎類(根物、ただし、にんにく、らっきょうを除く)※ ³	ハモグリバエ類	20倍			2.0ℓ/10a					
ねぎ	ネギコガ、ハモグリバエ類、シロイチモジヨトウ、アザミウマ類、クロバネキノコバエ類	2000～3000倍	100～300ℓ/10a	本剤:2回以内	フルキサメタミド剤:4回以内	散布				
	ネダニ類	2000倍	1ℓ/㎡	収穫21日前まで	本剤:1回	(苗浸漬は1回以内、株元灌注は1回以内、散布は2回以内)	株元灌注			
にら	アザミウマ類、クロバネキノコバエ類		1ℓ/㎡	収穫14日前まで	本剤:1回	フルキサメタミド剤:2回以内	株元灌注			
			収穫7日前まで	本剤:1回	(株元灌注は1回以内、散布は1回以内)					
ヤングコーン	ハダニ類	2000～3000倍	100～300ℓ/10a	2回以内	1回	散布				
未成熟とうもろこし	ハスモンヨトウ、オオタバコガ、コナジラミ類、アザミウマ類、トマトサビダニ、ハモグリバエ類、トマトキバガ	2000倍	100～300ℓ/10a							
トマト、ミニトマト	オオタバコガ、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、チャノホコリダニ									
ピーマン及びとうがらし類	コナジラミ類、アザミウマ類、ハダニ類、チャノホコリダニ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハモグリバエ類									
なす	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、ウリノメイガ、ハダニ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類									
うり類(未成熟)※ ⁴	アザミウマ類									
うり類(成熟、ただし、すいか、メロンを除く)※ ⁵	オオタバコガ、ウリノメイガ、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類	2000～3000倍	0.8～1.6ℓ/10a				収穫14日前まで	無人航空機による散布		
すいか、メロン	ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、アザミウマ類									
豆類(大豆、ただし、だいず、あずき、らっきょうを除く)	アズキノメイガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、アザミウマ類、ハダニ類	16倍	100～300ℓ/10a				2000～3000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	散布
だいず	アザミウマ類、マメシクイガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ウコンノメイガ、オオタバコガ、フタスジヒメハムシ、ハダニ類	2000～3000倍	100～300ℓ/10a							
えだまめ	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類	2000倍	100～500ℓ/10a	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	120分間鱗片浸漬				
豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く)	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハダニ類									
アスパラガス	ハスモンヨトウ、アザミウマ類、ハダニ類、ジュウシホシクビナガハムシ	2000倍	100～300ℓ/10a	200～400ℓ/10a	1回	散布				
オクラ	ハスモンヨトウ、オオタバコガ									
しょうが	ハスモンヨトウ	2000～3000倍	200～700ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布				
らっきょう	ネダニ類	2000倍	1ℓ/㎡	収穫30日前まで			本剤:1回	フルキサメタミド剤:5回以内	株元灌注	
	ホモノハダニ	1000倍	-	植付前	本剤:2回以内	30分間種球浸漬				
	ハモグリバエ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫14日前まで			本剤:2回以内	フルキサメタミド剤:2回以内	無人航空機による散布	
	アザミウマ類	2000～3000倍	2.0ℓ/10a	植付前	本剤:1回	120分間鱗片浸漬				
にんにく	ハモグリバエ類	2000～3000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで			本剤:1回	フルキサメタミド剤:2回以内	無人航空機による散布	
	アザミウマ類	20倍	2.0ℓ/10a	植付前	本剤:1回					
	チューリップサビダニ	2000倍	-							
茶	チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、マダラカサハラハムシ、ヨモギエダシヤク、チャノホソガ、チャトゲコナジラミ	2000～3000倍	200～400ℓ/10a	摘採14日前まで	1回	散布				
いちじく	アザミウマ類	2000倍	200～700ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	発生初期				
食用ざく	ハスモンヨトウ、ハダニ類、オオタバコガ、アザミウマ類		100～300ℓ/10a	収穫3日前まで						
きく	ハスモンヨトウ、ハダニ類、オオタバコガ、アザミウマ類		100～300ℓ/10a	発生初期						
きく(葉)	ハスモンヨトウ、ハダニ類、オオタバコガ、アザミウマ類		100～300ℓ/10a	発生初期						
りんどう	ハスモンヨトウ、ハダニ類、オオタバコガ、アザミウマ類		100～300ℓ/10a	発生初期						
ゆり	ネダニ類	2000～3000倍	-	植付前	1回	30分間種球浸漬				
チューリップ	チューリップサビダニ	2000倍	100～300ℓ/10a	摘花後～球根掘取り前まで	2回以内	散布				

*本剤及びフルキサメタミドを含む農薬の総使用回数の制限を示す。 ※1 結球あぶらな科葉菜類:キャベツ、はくさい、メキャベツ ※2 はなやさい類:ブロッコリー、カリフラワー、茎ブロッコリー ※3 鱗茎類(根物):たまねぎ、葉たまねぎ、食用ゆり、葉にんにく、のびる、ベルギーエシャロットなど ※4 うり類(未成熟):きゅうり、きゅうり(花)、ズッキーニ、ズッキーニ(花)、にがうり、赤毛ワリ、食用ひょうたん、食用へちま、しろうり、とうがん、はやとり、ゆうがお、エホバク ※5 うり類(成熟):かぼちゃ、まくわうり、漬物用まくわうり、漬物用メロン、漬物用すいか、ツノニガウリなど

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

最新の製品情報は
こちら

本資料は2025年10月末現在の登録内容に基づいています。