

殺虫剤
名称：アグリメック
 種類：アバメクチン乳剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2024年8月28日現在

作物名	適用病害虫名	希釀倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アバメクチンを含む農薬の総使用回数
なす メロン ピーマン	アザミウマ類 ハダニ類 コナジラミ類	500～ 1000倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
きゅうり					2回以内		2回以内
トマト	アザミウマ類 コナジラミ類 トマトサビダニ トマトハモグリ リバエ トマトキバガ	1000倍	1.6L/10a	収穫14日 前まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
すいか	アザミウマ類 ハダニ類 コナジラミ類						
ねぎ	アザミウマ類 ネギハモグリ バエ	8倍	1000倍	収穫前日 まで	2回以内	散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する	2回以内
たまねぎ	アザミウマ類 ネギハモグリ バエ						
みょうが(花穂)	ハダニ類	1000倍	100～ 300L/10a	みょうが(花穂) の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合 にあっては開花期終了まで	2回以内	散布	2回以内
みょうが(茎葉)							
いちご							

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。

シンジェンタジャパン株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番10号

殺虫剤
名称：アグリメッツ
 種類：アバメクチン乳剤

作物名	適用病害虫名	希釗倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アバメクチンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	アザミウマ類	1000～2000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	チャノホコリダニ ミカンハモグリガ ミカンサビダニ ナメクジ類 ヨモギエダシャク	2000倍					
	アザミウマ類 チャノホコリダニ ミカンハモグリガ ミカンサビダニ	12倍 24倍 30倍	4L/10a 8L/10a 10L/10a			無人航空機による散布	
茶	チャノキイロアザ ミウマ チャノナガサビダ ニ チャノホソガ カンザワハダニ チャノホコリダニ チャノコカクモン ハマキ チャトゲコナジラ ミ チャノミドリヒメ ヨコバイ	1000倍	200～400L/10a	摘採7日前まで	1回	散布	1回
ホップ	ハダニ類		200～700L/10a	収穫30日前まで	2回以内		2回以内
樹木類 (しきみを除く)	ネグサレセンチュ ウ	500倍	—	移植前	1回	60分間 根部 浸漬	1回
しきみ							2回以内
花き類・ 観葉植物 (ガーベラ を除く)	アザミウマ類	1000倍	200～700L/10a	発生初期	2回以内	散布	5回以内
ガーベラ	アザミウマ類 ハダニ類 トマトハモグリバ エ	500倍	100～300L/10a		5回以内		

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。

シンジェンタジャパン株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番10号