

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釀倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ミカンハダニ ミカンコナジラミ	2000倍	200~700ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	アブラムシ類 アザミウマ類 カイガラムシ類 サビダニ類 チャノホコリダニ					無人航空機による散布	
	32倍						
	40倍						
	50倍						
	80倍						
	100倍						
	160倍						
	250倍						
	320倍						
りんご	アブラムシ類 カイガラムシ類 ハダニ類 リンゴサビダニ リンゴワタムシ	2000倍	200~700ℓ/10a	収穫14日前まで		散布	

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釗倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数
なし	アザミウマ類 アブラムシ類 カイガラムシ類 ハダニ類 ニセナシサビダニ	2000倍	200~700ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
びわ	ビワキジラミ			収穫21日前まで	2回以内		2回以内
ぶどう	アザミウマ類 カイガラムシ類 ハダニ類 ブドウサビダニ ブドウハモグリダニ	2000倍	200~700ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
かき	アザミウマ類 カイガラムシ類			収穫14日前まで	3回以内		3回以内
パイナップル	パイナップルコナカイガラムシ	2000倍	200~700ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
もも ネクタリン 小粒核果類	アブラムシ類 カイガラムシ類 ハダニ類			収穫90日前まで	2回以内		2回以内
とうとう	カイガラムシ類 ハダニ類	カイガラムシ類					
オリーブ							
オリーブ(葉)							

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釗倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アザミウマ類、アオムシ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	アブラムシ類、コナガ	2000～4000倍					
	アザミウマ類	500倍					
	アブラムシ類	24倍					
	アオムシ	32倍					
	コナガ	40倍					
	アザミウマ類	50倍					
	アブラムシ類	64倍					
	アオムシ	80倍					
	コナガ	100倍					
	アザミウマ類	125倍					
	アブラムシ類	160倍					
	アオムシ	200倍					
	コナガ	250倍					
	アザミウマ類	320倍					
	アブラムシ類	500倍					
はくさい	アブラムシ類 コナガ	4000倍	100～300ℓ/10a			散布	

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釗倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数
ブロッコリー	アザミウマ類 アオムシ コナガ	2000倍	100~300ℓ/10a 25~50ℓ/10a 1.6~1.7ℓ/10a 1.7~2ℓ/10a 2~2.8ℓ/10a 2.8~3.5ℓ/10a 3.5~4.5ℓ/10a 4.5~5.5ℓ/10a 5.5~7ℓ/10a 7~8.5ℓ/10a 8.5~11ℓ/10a 11~14ℓ/10a 14~17ℓ/10a 17~20ℓ/10a 25~50ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布 無人航空機による散布	3回以内
	アブラムシ類	2000~4000倍					
	アザミウマ類 アブラムシ類	500倍					
		24倍					
		32倍					
		40倍					
		50倍					
		64倍					
		80倍					
		100倍					
		125倍					
		160倍					
		200倍					
		250倍					
		320倍					
		500倍					

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釗倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数
レタス	アザミウマ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布 無人航空機による散布	3回以内
	アブラムシ類	2000～4000倍					
	アザミウマ類 アブラムシ類	500倍					
		24倍					
		32倍					
		40倍					
		50倍					
		64倍					
		80倍					
		100倍					
		125倍					
		160倍					
		200倍					
		250倍					
		320倍					
		500倍					

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釗倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数
非結球レタス	アザミウマ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
	アブラムシ類	2000～4000倍					
	アザミウマ類 アブラムシ類	500倍					
		24倍					
		32倍					
		40倍					
		50倍					
		64倍					
		80倍					
		100倍					
		125倍					
		160倍					
		200倍					
		250倍					
		320倍					
		500倍					
ほうれんそう	アブラムシ類 ホウレンソウケナガコナダニ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで		散布	

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釗倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数	
かぼちゃ	アブラムシ類 コナジラミ類 ハダニ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	
		24倍	1.6～3.6ℓ/10a			無人航空機による散布		
		50倍	3.6～7.5ℓ/10a					
		100倍	7.5～15ℓ/10a					
きゅうり	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類 ハダニ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで		散布	3回以内 (灌注は1回以内)	
	アザミウマ類 ハダニ類	500倍	50mℓ/株	育苗期後半～定植当日	1回	株元灌注		
	アブラムシ類 コナジラミ類		25～50mℓ/株					
メロン すいか	アザミウマ類 ア布拉ムシ類 コナジラミ類 ハダニ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内 (灌注は1回以内)	
	アザミウマ類 ハダニ類	500倍	50mℓ/株	育苗期後半～定植当日	1回	灌注		
	ア布拉ムシ類 コナジラミ類		25～50mℓ/株					
ズッキーニ		2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釗倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数	
なす	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ ハダニ類 コナカイガラムシ類 うどんこ病	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内 (灌注は1回以内)	
	アザミウマ類 チャノホコリダニ ハダニ類 うどんこ病	500倍	50ml/株	育苗期後半～定植当日	1回	灌注		
	アブラムシ類 コナジラミ類		25～50ml/株					
ピーマン とうがらし類	アザミウマ類 ア布拉ムシ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ ハダニ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内 (灌注は1回以内)	
	アザミウマ類 チャノホコリダニ ハダニ類	500倍	50ml/株	育苗期後半～定植当日	1回	灌注		
	ア布拉ムシ類 コナジラミ類		25～50ml/株					

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釀倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数
トマト ミニトマト	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類 トマトサビダニ						
アスパラガス	アザミウマ類 コナジラミ類 ハダニ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
未成熟そらまめ	アザミウマ類						
いちご	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類						
	チャノホコリダニ			定植3日前～ 定植当日			
	アザミウマ類 ハダニ類 うどんこ病	500倍	50ℓ/株				
	アブラムシ類 コナジラミ類		25～50ℓ/株				
	アザミウマ類 アブラムシ類 クロバネキノコバエ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ ハダニ類	250倍	25ℓ/株	育苗期後半～ 定植当日	1回	灌注	3回以内 (灌注は1回以内)

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釀倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数				
みょうが (花穂)	アブラムシ類	2000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内				
みょうが (茎葉)				みょうが(花穂)の収穫前日まで ただし、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで							
しそ	アザミウマ類	4000倍		収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内				
にんにく	チューリップサビダニ			収穫7日前まで							
ねぎ	アザミウマ類	2000倍	4000倍 64倍 100倍 160倍 200倍 250倍 320倍 400倍	収穫7日前まで	3回以内	3回以内					
ばれいしょ	アブラムシ類										

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釀倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロテトラマトを含む農薬の総使用回数
さといも	アブラムシ類 ハダニ類	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
		8倍	0.8～1.2ℓ/10a			無人航空機による散布	
		12倍	1.6ℓ/10a			散布	
		24倍	3.2ℓ/10a			無人航空機による散布	
てんさい	アブラムシ類	2000～4000倍	100～300ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
		16倍	1.6～2.1ℓ/10a			無人航空機による散布	
		20倍	1.6～2.6ℓ/10a			散布	
		40倍	3.6～5.3ℓ/10a			無人航空機による散布	
だいこん	コナガ	2000～4000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
		2000倍					
チューリップ	チューリップサビダニ	4000倍		摘花後～球根掘取り前まで			