

日農フィールドマストフ ロアブル

[ジクロロメゾチアズ水和剤]

農林水産省登録 第24849号

有効成分 ジクロロメゾチアズ…18.4%

性 状 黄色水和性粘稠懸濁液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
×20 RACコード：殺虫[4E]

危険物：-

有効年限：3年

包装：250ml

特長

- 【新規の作用性】ジクロロメゾチアズは園芸剤として初めてIRAC分類：4Eに区分されました。
- 【問題害虫へ高い効果】既存剤に抵抗性を獲得したコナガを含むチョウ目害虫、キスジノミハムシに対して高い活性を示します。
- 【安全性が高い】哺乳類ミツバチ天敵への安全性が高い薬剤ですので、安心してご使用いただけます。
- 【「類」登録を有する】結球あぶらな科葉菜類、はなやさい類、非結球あぶらな科葉菜類、レタス類の登録を有するため、マイナー作物にも使用可能です。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用する前によく振る。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 間引き菜、つまみ菜に使用しない。
- みずかけな（水掛菜）に使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用する。また、使用後14日間は入水しない。
- 蚕に対して影響を及ぼすおそれがあるので、養蚕で使用する桑葉にかからないようにする。
- 散布薬液の調製容器、散布器具などは水でよく洗浄する。また、洗浄した廃液は河川等に流さない。
- 空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理する。
- 本剤の使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受ける事が望ましい。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分に確認してから使用する。
- 本剤は自動車や壁などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意する。
- 本剤は衣服（白衣）などに散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意する。

安全使用上の注意事項

- アレルギー性反応を起こすおそれがある。

水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器等は、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジクロロメゾチアズを含む農薬の総使用回数
結球あぶらな科葉菜類 (はくさい、キャベツを除く)	アオムシ コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウワバ類 シロイチモジヨトウ カブラハバチ類	4000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
キャベツ	アオムシ コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウワバ類 シロイチモジヨトウ カブラハバチ類 ナモグリバエ						
はくさい	アオムシ コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウワバ類 シロイチモジヨトウ カブラハバチ類 キスジノミハムシ ダイコンハムシ						
だいこん	アオムシ コナガ ヨトウムシ キスジノミハムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類 ダイコンハムシ			収穫3日前まで			
はなやさい類	アオムシ コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ シロイチモジヨトウ						
非結球あぶらな科葉菜類	アオムシ コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ キスジノミハムシ ナモグリバエ			収穫前日まで			
レタス類	ハスモンヨトウ ヨトウムシ ナモグリバエ						
かぶ	アオムシ コナガ ヨトウムシ キスジノミハムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類						

製品写真



最新の登録内容はこちら

